

Zkouška M1100, středa 6.1.2010, 8:00–10:00 hodin

## 1. část (praktická)

1. (1 bod) Určete všechny hromadné body posloupnosti

$$b_n = (-n)^{\sin(n\pi/2)}.$$

2. (1 bod) Určete definiční obor funkce
- $f$
- a funkce
- $f'$
- . Funkci
- $f'$
- zjednodušte.

$$f(x) = \ln(\ln(5 - \sqrt{25 - x^2})).$$

3. (1 bod) Vypočítejte následující limity

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^m - 1}{x^n - 1}, \quad (m, n \in \mathbb{Z}, m \neq 0, n \neq 0).$$

[Uvažte různé možnosti znamének pro exponenty  $m$  a  $n$  a využijte vztah  $x^k = \frac{1}{x^{-k}}$  pro  $k < 0$ .]

4. (1 bod) Půdorys divadelního jeviště je sjednocením obdélníka, půlkruhu a dvou čtvrtkruhů, přičemž půlkruh přiléhá k jedné straně obdélníka a čtvrtkruhy přiléhají ke dvěma rovnoběžným stranám obdélníka (viz obr.). Celkový obvod půdorysu je
- $\ell = 100$
- metrů. Určete rozměry půdorysu jeviště, víte-li, že byly stanoveny tak, aby byla plocha jeviště co největší. Určete také tuto maximální plochu jeviště. Pro jednoduchost počítejte s hodnotou
- $\pi \approx 3$
- .

5. (2 body) Vyšetřete průběh funkce
- $f(x) = \frac{-\ln x}{\sqrt{x}}$
- . Druhá derivace funkce
- $f$
- je

$$f''(x) = \frac{8 - 3 \ln x}{4x\sqrt{x}}.$$

Pro výpočty můžete použít  $e^2 \approx 7.39$ ,  $e^{8/3} \approx 14.39$ ,  $\frac{2}{e} \approx 0.74$ ,  $\frac{8}{3e^{4/3}} \approx 0.70$ ,  $\frac{1}{3e^4} \approx 0.01$ .

6. (1 bod) Určete primitivní funkci
- $k$

$$f(x) = \frac{1}{1 - \cos x}.$$

[Jedna z možností výpočtu je univerzální substituce  $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$ .]

7. (1 bod) Uvažujme funkci

$$f(x) = \frac{2}{x^2 - 1} \quad \text{pro } x \in (a, \infty),$$

kde  $a \geq 1$  je parametr. Tato funkce je nezáporná. Pomocí vhodného nevlastního integrálu určete plochu mezi grafem funkce  $f$  a osou  $x$  na intervalu  $(a, \infty)$ .

8. (2 body) Uvažujme čtverec s délkou hrany
- $a$
- (
- $a > 0$
- ) umístěný svým levým dolním rohem do počátku souřadné soustavy (viz obr.). Plocha tohoto čtverce je pokryta hmotou tak, že specifická hmotnost v bodě
- $[x, y]$
- (
- $x, y \in [0, a]$
- ) je přímo úměrná vzdálenosti bodu
- $x$
- od počátku, tj.
- $s(x) = kx$
- (
- $k > 0$
- ). Určete polohu těžiště tohoto čtverce.

Zkouška M1100, středa 20.1.2010, 8:00–10:00 hodin

## 1. část (praktická)

1. (1 bod) Určete všechny hromadné body posloupnosti

$$b_n = (-n)^{\sin(n\pi/2)}.$$

2. (1 bod) Určete definiční obor funkce
- $f$
- a funkce
- $f'$
- . Funkci
- $f'$
- zjednodušte (odstraňte složené zlomky).

$$f(x) = \frac{\arccos x}{\sqrt{1-x^2}} + \ln(2 - \sqrt{4-x^2}).$$

3. (1 bod) Vypočítejte následující limity

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^m - 1}{x^n - 1}, \quad (m, n \in \mathbb{Z}, m \neq 0, n \neq 0).$$

[Uvažte různé možnosti znamének pro exponenty  $m$  a  $n$  a využijte vztah  $x^k = \frac{1}{x^{-k}}$  pro  $k < 0$ .]

4. (1 bod) Ramena a menší základna lichoběžníku mají velikost
- $a = 4$
- cm (viz obr.). Určete velikost
- $b$
- jeho větší základny tak, aby byl obsah lichoběžníku maximální.

5. (2 body) Vyšetřete průběh funkce

$$f(x) = e^{-\frac{6}{x^2}}.$$

[Pro výpočty můžete použít  $e^{-\frac{3}{2}} \approx 0.22$ .]

6. (1 bod) Určete primitivní funkci
- $k$

$$f(x) = \frac{1 - \sqrt[3]{x}}{x + \sqrt[3]{x}}.$$

7. (1 bod) Uvažujme funkci

$$f(x) = \frac{\operatorname{arctg} x}{x^3} \quad \text{pro } x \in [1, \infty).$$

Tato funkce je nezáporná. Pomocí srovnávacího kritéria pro nevlastní integrály určete horní odhad pro plochu mezi grafem funkce  $f$  a osou  $x$  na intervalu  $[1, \infty)$ . Příným výpočtem pak určete jeho přesnou velikost této plochy.

8. (2 body) Vypočítejte objem rotačního tělesa, které vznikne rotací grafu funkce

$$f(x) = e^{3x} \sqrt{\sin(6\pi x)}$$

kolem osy  $x$  na intervalu  $[0, \frac{1}{6}]$ . (Viz obr.)Doplňková (nepovinná) otázka: Určete obvod největší kružnice, kterou lze dostat na svislém řezu tohoto tělesa. [Nápověda pro doplňkovou otázku: Uvědomte si, že funkce  $\operatorname{tg} x$  je periodická s periodou  $\pi$  a že záporné hodnoty funkce  $\operatorname{arctg} x$  lze eliminovat přičtením periody nebo jejího vhodného násobku k argumentu (tj. použitím jiné větve funkce  $\operatorname{tg} x$ , než jakou bereme obvykle). Při výpočtu použijte  $\operatorname{arctg} \pi \approx 1.26$ .]